



داء السل



Hospital Universitario  
Ramón y Cajal

Comunidad de Madrid



و الآن إعتني بصحتك و صحة أقاربك

**Hospital Ramón y Cajal**

Unidad de Medicina Tropical

Servicio de Enfermedades Infecciosas

Carretera de Colmenar, km. 9,1  
28034 - Madrid

91 336 81 08 

Begoña (línea 10) 

Estación Ramón y Cajal 

135 (Plaza de Castilla) 

**sanofi aventis**

La Salud es lo esencial

قم بزيارة طبيبك إذا:

- لاحظت أن لك أعراض تدل على الإصابة بمرض السل
- كنت تعيش مع شخص يعاني من داء السل



لا يعدي



كن حذرا





ما هو؟

داء السل هو مرض ينتج بعد الإصابة بجرثومة تسمى عصية السل أو عصية كوخ و التي تصيب الرئتين عادة. قد يعالج هذا المرض إذا إتبعنا علاجاً بانتظام و أكملناه حتى النهاية.

## طرق العدوى بداء السل



ينتقل عن طريق الهواء حين يقوم الشخص المصاب بالسعال أو البصاق أو العطس.

## بعد الإصابة بالعدوى قد تحدث حالتان:

العدوى (العصية غير نشيطة):

ليس هناك مرض. و ليست هناك عدوى.

المرض (العصية نشيطة):

هناك مرض. و هناك عدوى.

على أفراد الأسرة و الأشخاص الذين يعيشون مع المصاب بداء السل زيارة الطبيب لإجراء إختبار لقاح السل.

## معاملات لا تنقل العدوى



من الممكن مشاركة الشخص المصاب نفس الأواني المنزلية



من الممكن مصافحة الشخص المصاب أو معانقته



السل ليس بمرض وراثي

ما هي الأعراض؟

- السعال المستمر
- الحمى
- فقدان الوزن



ما هي طريقة العلاج؟



في هذه الحالة لابد من معالجة المرض. و طريقة العلاج هي تناول عدة أقرص خلال بضعة شهور. و لأجل الشفاء التام لابد من اللجوء إلى الزيارات الطبية دورياً و كذا إكمال العلاج حتى النهاية.

كيف يتم تشخيص المرض؟



يمكن التعرف على المرض عن طريق التصوير بالأشعة أو إجراء تحليل للبصاق.

تشخص العدوى عن طريق إختبار لقاح السل أو إختبار السلين الجلدي (مانتوكس) و هي عبارة عن حقنة تعطى تحت الجلد بالساعد. إن النتائج تظهر بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام. إذا إنتفخ الجلد فإنه يدل على وجود العدوى بعصية داء السل



في هذه الحالة لابد من إتخاذ الإجراءات التي تمنع تطور المرض و طريقة العلاج هي تناول قرص واحد خلال بضعة شهور. من الضروري إكمال العلاج حتى النهاية