

CONOCE MÁS SOBRE
TUBERCULOSIS
LATENTE O
INFECCIÓN
TUBERCULOSA


Subvencionado por:



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA
Y EQUIDAD EN SALUD

DIVISIÓN DE CONTROL
DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES
Y TUBERCULOSIS



Contagio

Si respiras las bacterias de la tuberculosis, éstas entran en tu organismo y pueden alojarse en tus pulmones.

Infección tuberculosa

- No hay ningún síntoma.
- No te sientes mal.
- No puedes transmitir la bacteria de la tuberculosis a los demás.
- Puedes desarrollar la enfermedad si no recibes tratamiento.

Tener la INFECCIÓN no es lo mismo que tener la ENFERMEDAD

¿Cómo saber si tienes enfermedad tuberculosa?

1

Prueba IGRA



Mediante un análisis de sangre

2

Prueba de tuberculina o prueba de Mantoux

Reacción al antígeno de la tuberculina



Es una inyección debajo de la piel. El personal sanitario dibujará un círculo en la zona de punción, donde aparece un pequeño bulto.


Después de dos o tres días se puede producir una pequeña reacción en la zona. De forma general:

- Si no hay reacción, NO hay infección.
- Si hay reacción, HAY infección.

¿Qué hacer si hay reacción en alguna de las dos pruebas?


1

Radiografía de tórax



2

Análisis de esputo (en caso de alteración en la radiografía)



Estas pruebas nos confirmarán si tenemos INFECCIÓN TUBERCULOSA (la bacteria está dormida) o ENFERMEDAD TUBERCULOSA (la bacteria está activa).

Si tienes TUBERCULOSIS LATENTE O INFECCIÓN TUBERCULOSA

Tratamiento preventivo

EVITA LA ENFERMEDAD

Aunque no tengas síntomas ni puedas transmitir la infección, debes terminar todo el tratamiento para evitar que la bacteria se active y desarrollar la enfermedad.

El tratamiento puede ser muy largo, pero para que sea efectivo hay que terminarlo.

Para más información:

+34 722 140 142

+34 622 042 564

info@saludentreculturas.es

www.saludentreculturas.es